

¿Toma alguno de estos medicamentos recetados para el dolor?

Estos son medicamentos recetados para el dolor llamados opioides. Tomar un opioide durante el embarazo, puede causar graves problemas a su bebé.

- **Buprenorfina** (Belbuca®, Buprenex®, Butrans®, Probuphine®)
- **Codeína**
- **Fentanilo** (Actiq®, Duragesic®, Sublimaze®)
- **Hidrocodona** (Lorcet®, Lortab®, Norco®, Vicodin®)
- **Hidromorfona** (Dalaudid®, Exalgo®)
- **Meperidina** (Demerol®)
- **Metadona** (Dolophine®, Methadose®)
- **Morfina** (Astramorph®, Avinza®, Duramorph®, Roxanol®)
- **Oxicodona** (OxyContin®, Percodan®, Percocet®)
- **Oximorfona** (Opana®)
- **Tramadol** (ConZip®, Ryzolt®, Ultram®)

La heroína, una droga ilegal, es un opioide. El fentanilo y otros opioides recetados se están elaborando y vendiendo ilegalmente.

Los opioides pueden ser peligrosos y adictivos. Pueden causar problemas a un bebé en las primeras semanas del embarazo, antes de que usted sepa que está embarazada.

Si usted toma opioides durante el embarazo, su bebé puede estar expuestos a ellos en la matriz y pasar por la abstinencia después de nacer, conocido como el síndrome de abstinencia neonatal o NAS. Aunque use un opioide exactamente como se lo indique su profesional, igual puede causar NAS a su bebé.

MIRE UN VIDEO

nacersano.org/opioides

TOME ACCIÓN

Pregunte sobre su medicamento.

Si usted toma medicamentos para calmar el dolor, pregúntele a su profesional:

1. ¿Es un opioide este medicamento? Sí No

2. Si es opioide, ¿por qué necesito tomarlo?

3. ¿Cuáles son los riesgos para mi bebé?

4. ¿Puedo tomar un medicamento más seguro?

Yes No

5. ¿Cuál medicamento es más seguro?

Si está embarazada y usa opioides:

- No deje de tomar un opioide hasta que consulte con su profesional. Dejar de usarlos repentinamente puede causar problemas graves para su bebé.
- Dígale a su proveedor de cuidado prenatal sobre cualquier opioide u otro medicamento que tome, aunque se lo haya recetado otro profesional de la salud.
- Si visita a un profesional que le receta un opioide, asegúrese que sepa que está embarazada.

Si no está embarazada y usa opioides:

- Use un anticonceptivo confiable hasta que deje de tomar el opioide.
- Hable con su profesional acerca de tomar un medicamento para el dolor que sea más seguro.